

Troubles des conduites sociales

Soumis par Stephane Desbrosses

Troubles des conduites sociales

1. Suicide et tentative de suicide On parle de suicidé pour le mort et de suicidant pour celui qui a fait une tentative. Les suicidants sont les plus nombreux (150.000 tentatives de suicide en France par an), le ratio est de 2F/1H. En ce qui concerne les suicides, qui représentent % des morts (12000/an), le ratio est inversé (1F/2H). Cela pourrait provenir des méthodes employées : les femmes ingèrent des substances toxiques (psychotropes et alcool) alors que les hommes ont des moyens plus efficaces (pendaison ou arme à feu).

Certaines conduites peuvent être considérés comme des équivalents suicidaires : conduites à risques comme les toxicomanies, la conduite automobile à risque, les conduites alimentaires à risque, certaines conduites sexuelles,... En ce qui concerne les tentatives de suicide, l'existence d'antécédents familiaux, personnels... est considérée comme un facteur de risque élevé. On tient aussi compte des facteurs socio-environnementaux : les situations professionnelles et familiales, l'âge, le niveau de soutien dont bénéficie l'individu sont des facteurs importants à prendre en compte. 2. Homicidell est somme toute assez rare en psychopathologie. Certaines contextes/situations psychopathologiques sont associés à une forte dangerosité et un potentiel non négligeable de passage à l'acte hétéro-agressif. On en trouve surtout chez les patients délirants, surtout si délire érotomaniaque (=érotomane), de jalousie ou de persécution, donc surtout dans un contexte paranoïaque. 3. Fugue Il s'agit d'un abandon impulsif inattendu et limité dans le temps, de son domicile, que l'on trouve surtout dans :

- les troubles du comportement à l'adolescence
- les périodes d'excitation maniaque
- les troubles psychotiques (contexte délirant)

Source : Connaissances générales